يشترط فى تغذيه البادجى احتواء الغذاء على جميع العناصر الغذائيه الرئيسيه (الكربوهيدرات – البروتين – الدهون – الفيتامينات – المعادن – الماء)

١-*البروتين* :

من اهم مصادره الحيوانيه هى اللبن والبيض ويقدم دائما فى الطعام اللين . ومن مصادر البروتين النباتى : الحلبه و عباد الشمس والفلارس (الكتان) ويشترط فى هذه البذور ان تكون خاليه من الشوائب وجافة وخاليه من التعفن و بذور الحشائش...والبروتين هام وضرورى لتعويض الطائر عملية تجديد و تبديل الريش وله اثر كبير فى النمو وبناء الجسم .

٢-*الكربوهيدرات*:

وهى هامه فى النمو و انتاج الطاقه والنشاط و الحيويه و العمل على رفع معدلات الهضم ومن اهم مصادره الدنيبه والذرة العويجه

٣-*الدهون*:

وهى هامه جدا لانتاج الطاقه والمحافظه على حرارة الجسم وتحسين الكفاءة الغذائيه وكبر حجم الطيور كما ان لهل اهميه كبرى فى الخصوبه وانتاج البيض ومن اهم المصادر : القرطم و الفول السودانى "المجروش والمحمص".

٤-*الاملاح المعدنية* :

وهى تفيد اجهزة الجسم واغشيته والسيطره وتنظيم افراز الغدد – تنشيط الخمائر والانزيمات المحلله للغذاء – بناء و تكوين وتكاثر كرات الدم الحمراء – تنقيه الجسم والدم اثناء التنفس – قوة ومتانه المفاصل و العظام و يتم الحصول عليها من الاغذية النباتية الخضراء الطازجة مثل : خس- كرفس- بقدونس- شيت –فجل -سبانخ- جزر- جرجير- تعطى بكمية متوسطة مرتين او ثلاثة اسبوعيا . و من المحار او السبيط fish bone و هو مصدر رئيسى لاملاح الكالسيوم و تكفى القطعة زوج الطيور ٢-٣ اسابيع و ايضا مسحوق قشر البيض على ان يكون جيد الطحن لعدم تعود الطيور على اكل البيض ويضاف للحبوب بنسبة ٠,٥ % ايضا .

٥-*الفيتامينات*:-
و هى مركبات حيوية توجد فى الاغذية الطبيعية ولا يستغنى عنها جسم الطائر و نقصها يؤدى الى ظهور اعراض مرضية مختلفة و من اهمها:

D بناء العظام وقوة الجسم

A النمو و قدرة الابصار

E رفع الحيوية و الخصوبة والتاثير العصبى

B النمو و منع الالتهابات- تقوية ونمو الريش

K منع الانزفة الداخلية و علاج الكسور و الجروح

C و قاية من نزلات البرد والحفاظ على الاغشية

وهى تتواجد فى التفاح والكمثرى و البلح والكنتالوب و الجوافة .....و يمكن اعطاء الطيور مركبات الفيتامينات على صورة عقاقير (مثل توكوفيرول – فيتاسيد) مع مراعاة النسب المناسبه حتى لا يحدث تسمم من زيادة الفيتامين و يجب اعطاء الفاكهة بكميات قليلة و بسرعة لعدم تعفنها او تلفها

٦-*المهدئات* :-
هى مركبات صناعيه هامه فى تهدئه الطيور وذلك لكثرة حركتها وحدة مزاجها وعصبيتها وسرعة تأثيرها وهياجها وتعرضها للاثاره والمعاكسات خاصة عند التعرض للخوف والضوضاء والازعاج ومن امثلتها : البرومازين – ريسيرين- سيرباسيل .

٧- *فاتحات الشهيه* :-
مواد كيماويه لزيادة اقبال الطيور على تناول الغذاء مثل : جوالايريكا – كابالا

أو مواد طبيعيه : زيت زيتون – العسل الاسود – الفاكهة.

٨-*الرمل* :
يلزم توفر الرمل النقى النظيف لتسهيل التقاط الطيور لحبيباته لتساعد على تنشيط عمل القونصه فى عمليه الهضم بالاضافه الى زيادة شهية الطيور والعمل على تنشيطها وحيويتها .

ارشادات هامه خاصه بتغذية البادجى

يراعى تنفيذ هذة الارشادات بدقه حتى تحصل على نتائج جيده:

1- الحبوب الجافه : يقدم خليط من الدنيبه و البنكم والفلارس مع تقديم البرغل أو الجريشه منفصلا.

2- الاطعمه الخضراء الطازجه مثل (الخس و الجرجير و الجزر) و الفواكه مثل (الكنتالوب – الجوافه – الكمثرى) مرتين اسبوعيا .

3- الغذاء اللين ويتكون من :*ملئ اليد من لباب الخبز الجاف + ½ بيضه مسلوقه جيدا حوالى ٢٠دقيقة + ½ ملعقه شاى من مسحوق قشر البيض (من المسلوق سابقا) + ١/٤ جزره مبشوره أو تفاح مبشور او بقدونس او مريميه خضراء او كزبره خضراء او نعناع اخضر او ريحان . و يوضع هذا الخليط فى الخلاط مع العد من ١ الى ١٢ ثم يتم ايقاف الخلاط ويقدم طازجا للطيور ويرمى فى نهاية اليوم لانه سهل التعفن .و يفضل تقديم الغذاء اللين للعصافير الصغيره فيما لا يقل عن ٣ مرات اسبوعيا وبكميات قليله و بعد العزل عن ابائها فقد وجد انه يزيد من نمو الريش ويساعد على النمو بشكل عام.

4- يمكن فى الشتاء تقديم حبوب الشوفان والفول السودانى المحمص والمجروش ولكن بكميات قليله لانه يسبب السمنه للطيور.

5- بالنسبه للماء يجب عدم استخدام الماء مباشرة من الحنفيه و انما يجب استخدام مياه مفلتره او سبق غليها ثم تركت لتبرد (تترك مغطاه مع عدم تقليبها واخذ المياه العلويه فقط) او المياه المعدنيه او مياه الامطار.

6- يجب عدم وضع الفيتامينات فى الماء اثناء فترة التزاوج لان الاناث تشرب كثيرا فى هذه الفترة وقد يحدث لها تسمم من كثره الفيتامينات.

7- غصون الذرة العويجه تعتبر علاجا مميزا من حيث القيمه الغذائيه وذلك للعصفور المريض او الضعيف و غصن واحد منها يعتبر كافيا فى اليوم الواحد اما بالنسبه للعصفور السليم (غير البدين) فيمكن اعطاءه مقدار ٥ سم من هذا الغصن يوميا أو بالتناوب مع القرطم (ملئ ملعقه شاى مع كميه من الحبوب العاديه مره واحده اسبوعيا).

٨- ممكن نقع البرغل (الجريشه) لمدة ٢٤ ساعه قبل التقديم فى زيت كبد الحوت وتقدم بمعدل وقه لكل زوج (كيلو برغل عليه ٤٠٠٠وحده دوليه فيتامينA .

المصادر :

١- موقع جنة العصفور الأسترالى
٢- كتاب تربية طيور الزينة للأستاذ رضوان بلال

3- كتاب انا احب عصفورى الاسترالى د/ اسامه رشاد و د/ حسام يونس

حقوق الطبع محفوظة لمنتديات هواة تربية طيور الزينة

http://www.canaryfans.com/forum

كاتب المقال : أحمد حلمى الشناوى