الإستعدادات قبل موسم الشتاء أمممممم، إذن نتكلم أولاً عن موسم الصيف منذ شهر مايو و مع أخر دورة تفريخ تنتهى فى هذا الشهر ، نقوم برفع الأعشاش و نغسلها بالماء و الصابون ثم نضعها فى مكان تغمرة أشعة الشمس ، و بعد ذلك نقوم بفصل الذكور عن الإناث ، و نضعهم فى الأقفاص الكبيرة (السلاكات) flight بحيث تكون الذكور وحدها و الإناث وحدها ، ثم نقوم بتغذيتهم تغذية جيدة بها خليط جيد من الحبوب و هى الدنيبة : البنكم : الفلارس بنسبة ٢ : ٢ :١ مع توفير مصدر الكالسيوم المناسب و كذلك الغذاء اللين (ملئ اليد من لباب الخبز الجاف + ½ بيضه مسلوقه جيدا حوالى ٢٠دقيقة + ½ ملعقه شاى من مسحوق قشر البيض (من المسلوق سابقا) + ٤/١ جزره مبشوره او تفاح مبشور او بقدونس او مريميه خضراء او كزبره خضراء او نعناع اخضر او ريحان . و يوضع هذا الخليط فى الخلاط مع العد من ١ الى ١٢ ثم يتم ايقاف الخلاط ويقدم طازجا للطيور ويرمى فى نهاية اليوم لانه سهل التعفن . و يقدم لهم مرتين أسبوعياً و يفضل تقديم الغذاء اللين للعصافير الصغيره فيما لا يقل عن ٣ مرات اسبوعيا وبكميات قليله و بعد العزل عن ابائها فقد وجد انه يزيد من نمو الريش ويساعد على النمو بشكل عام.) و كذلك تقديم الغذاء الأخضر)الخس و الجرجير و الجزر (و الفواكه مثل)الكنتالوب – الجوافه – الكمثرى-البطيخ) .و فى هذة الأثناء تكون أقفاص التزاوج قد تم غسلها و تنظيفها ، و على ذلك يتم إعتبار فصل الصيف هو فصل الراحة بالنسبة للطيور ذكوراً و إناثاً . أما فى بداية فصل الخريف أو من منتصف شهر سبتمبر يبدأ الموسم و هنا يتم إعادة الأزواج الى بعضها ، و إعادة الأعشاش الى الأقفاص ، مع الأستمرار فى النظام الغذائى السابق و يزاد علية حبوب الشوفان والفول السودانى المحمص والمجروش ولكن بكميات قليله لانه يسبب السمنه للطيور. و يجب عدم وضع الفيتامينات يومياً فى الماء اثناء فترة التزاوج لان الاناث تشرب كثيرا فى هذه الفترة وقد يحدث لها تسمم من كثره الفيتامينات. و أيضاً غصون الذرة العويجه تعتبر علاجا مميزا من حيث القيمه الغذائيه وذلك للعصفور المريض او الضعيف و إذا كان الجو قارص البرودة و غصن واحد منها يعتبر كافيا فى اليوم الواحد اما بالنسبه للعصفور السليم (غير البدين) فيمكن اعطاءه مقدار ٥ سم من هذا الغصن يوميا او بالتناوب مع القرطم (ملئ ملعقه شاى مع كميه من الحبوب العاديه مره واحده اسبوعيا).
و كذلك ممكن نقع البرغل (الجريشه) لمدة ٢٤ ساعه قبل التقديم فى زيت كبد الحوت وتقدم بمعدل وقه لكل زوج (كيلو برغل عليه ٤٠٠٠وحده دوليه فيتامينA.
و يتم إعداد بعض المضادات الحيوية و الفيتامينات و محلول معالجة الجفاف و البيتادين المطهر أو الديتول و قطن طبى و شريط لاصق طبى كأدوات إسعاف أولية ثم يتم تجهيز كروت لأفراخ الجديدة و تعليق كروت للأعشاش خاصة بالدورة الجديدة ، و إذا كانت حلقات الأرجل متوفرة فيجب تجهيز كمية مناسبة منها أيضاً
و يجب توفير كمية كافية من الحبوب ، و تخزينها فى مكان جيد التهوية و جاف و فى عبوات مغلقة
وتعليق مجاثم أفرع نظيفه غير دائريه مع عدم وضع مراجيح داخل الأقفاص ، هذا قبل بداية الدوره الأنجابيه ، اما أثناء الرقاد يتم تنظيف الأقفاص أسبوعيا ولكن مع الأنتباه الى عدم أزعاج الأناث بكثرة التنظيف .
توفير بطارية إضاءة لفحص البيض ، و لا تكون قوية بحيث تخرج طاقة حرارية قد تؤدى الى إيذاء البيض
توفير أقفاص العزل للطيور المريضة

توفير ترمومتر داخل الغرفة لقياس درجة حرارة الغرفة بإستمرار ، و انا شخصيا أضع مدفأة بسيطة داخل الغرفة لتسخين الجو أثناء برد الشتاء
توفير أحواض الإستحمام
1- يجب أن تكون متأكدا من أن الطيور فى حالة التزاوج قبل أن تضع الأزواج معا وهذا يعنى أن الطيور يجب أن تكون نشطه للغايه ، الإناث تحاول أن تقرض أى شئ يقع تحت بصرها و الذكور تنادى على الإناث و تطعمها .. و عامه الكير وهو أنف الطائر يكون أزرق غامق لامع و فى الإناث يكون بنى فاتح وهذا ليس دائما فبعض الإناث لا يتغير فيها لون الكير من الأزرق الفاتح جدا و لكن تستطيع التزاوج.
2- لكى تتأكد من أن البيض مخصب فإنها فكره جيده جدا أن تقوم بحلق الشعر(الريش المزغب) حول فتحة المجمع عند الذكر و الأنثى بالمقص قبل أن تضعهم فى قفص التزاوج و يجب أيضا عمل ذلك بين دورات الإنجاب ، و يلاحظ أنه غير مسموح بنزع الريش و لكن قصه فقط .
3- فى بعض الأحيان تلقى الأنثى ببعض البيض خارج العش و ذلك لأنها عرفت أن هذا البيض غير مخصب !!! فلا تعيد لها البيض مرة أخرى .
4- قد تحدث ظاهره مؤسفه جدا و مميته وهى إحتجاز البيض داخل الأنثى ، وعلامات ذلك علامات الإنهاك على الأنثى و الرقاد فى قاع القفص أو العش و لا تستطيع الحركه و يكون تنفسها سريع ، فلا تنزعج و إتبع الأتى: إدهن فتحة المجمع بالزيت أو الفازلين أو الكريم ثم أحضر وعاء به ماء دافئ غير ساخن ، ضع فيه الجزء السفلى من الأنثى ثم مرر أصبعك حول فتحة المجمع و إضغط برفق من أعلى البطن إلى أسفل لدفع البيضه - التى سوف تشعر بها تحت أصبعك - للخروج و لكن بدون عنف و بطريقه حساسه حتى لا تنكسر البيضه بداخلها فتموت ، ثم توضع البيضه تحت أنثى أخرى و توضع الأنثى فى مكان دافئ حتى تتعافى ولا تجعلها تتزاوج مرة أخرى هذا الموسم ، و بالتأكيد سوف تعطيك نتيجه جيده فى الموسم التالى
5- فى الأماكن التى بها ماء عسر مثل مياه الآبار فإن تقديم هذه المياه للطيور قد ينتج بيض به قشره سميكه قد لا يستطيع الطائر الصغير تكسيرها للخروج من البيضه و قد يموت داخلها.
6- يجب عدم وجود أى بلل داخل العش خاصة فى نشارة الخشب التى يفرشها بعض المربين داخل العش (وإن كنت لا أفضل فرش أى شئ داخل العش) لأن ذلك يمنع بخر الماء من داخل البيضه وقد يؤدى الى وفاة الطائر داخل البيضه لأنه توجد كميه معينه من الماء الذى يتبخر بإنتظام من البيضه ، إذا زادت هذه الكميه أو قلت من الممكن أن تؤدى إلى وفاة الطائر الصغير .
7- أحيانا تكون بعض الإناث هائجه و مضطربه وقد تقوم بكسر بعض البيض أثناء حركتها المضطربه ، أنقل البيض تحت أناث أخرى ثم ضع تحتها بيض رائق أو بيض بلاستيكى وعندما تستقر الأنثى فى الرقاد فإنه يمكن إعادة البيض إليها مرة أخرى .
8- لكثير من الظروف التى قد تواجهها فيمكنك وضع أرقام و علامات على البيض بإستخدام قلم ذو حبر تركيبته مائيه وليست كيميائيه لكى تعرف لمن هذا البيض إذا ما اضطررت لقل البيض تحت أنثى أخرى لأى ظرف
9- قد يكون من المفيد وضع بيضه من البلاستيك وسط البيض و يراعى أن تكون أكبر قليلا فى الحجم من البيض الحقيقى و ذلك لغرضين :
أ-عندما تترك الأنثى العش لأى سبب فان البيضه البلاستيك تحتفظ بحرارة الأم و

تساعد على بقاء البيض دافئا
ب- هذه البيضه لأنها أكبر قليلا فى الحجم فهى تمنع الأنثى من الجلوس على البيض بطريق تؤذيه.
10-قد يحدث لسوء الحظ أن تموت الأنثى الأم و أولادها ما زالوا صغارا يحتاجون إلى رعايه ..عدد قليل من ذكور الأسترالى يقوم برعاية الصغار بنفسه ، و لكن فى معظم الحالات تموت الصغار إلا إذا إستطعت أن تجد لهم أما بديله تقبل أن تربيهم بجانب صغارها ، و لحسن الحظ أن أمهات الأسترالى تقبل تربية صغار غير صغارها إذا كانت هى نفسها تحتها صغار تربيهم ، ولكن يجب توزيع الصغار على الأمهات لأنه من غير المعقول أن تضع الصغار جميعهم تحت أنثى و احده بحيث لا تربى أى أنثى أكثر من ٧ أفراخ فقط فى المره الواحده .
و بالنسبة للوقاية من نزلات البرد فأنا شخصياً لا أتبع نظاما وقائيا محدداً ، و لكنى أضع الطيور داخل غرفة مغلقة و لا أسمح بدخول التيارات الهوائية فيها .و إنما أسمح بدخول أشعة الشمس و الهواء بدون تيارات هوائية ، و أقوم بتركيب شفاط لسحب الروائح و الهواء الفاسد من الغرفة الى الخارج و لا أدخل أنا أو أى أحد الى الغرفة أثناء الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا

حقوق الطبع محفوظة لمنتديات هواة تربية طيور الزينة

http://www.canaryfans.com/forum

كاتب المقال : أحمد حلمى الشناوى